



Santos Dumont 4345 - (1427) Buenos Aires
Tel.: 4855-6374 / 4854-5523 - Fax: 4854-0282
E-mail: aviar1@laboratoriosaviar.com.ar

Bloataid 80

Composición

Polioxietilen Lauril Eter 80% p/v.

Indicaciones

Está indicado como preventivo y curativo del timpanismo (empaste meteorismo) del bovino producido por el pastoreo de leguminosas (alfalfa, tréboles, etc). El producto protege a los animales durante 24hs. Puede administrarse sin contraindicaciones en vacas lecheras en producción como a ganado de carne.

Indicaciones

Bovinos.

Administración y dosis

Dosis preventiva es de 2.5 ml cada 100 kgpv, dosis curativa es de 12.5 ml/100 kgpv.

En el agua de bebida: Calcular 2.5 ml cada 100 kgpv. Un animal que pese entre 200 a 300 kg, consume 30 a 40 L de agua por día y debe recibir una dosis de 7.5 ml de producto.

Aplicación en pasturas por aspersión: El producto debe diluirse en 100 a 200 L de agua, aplicando al equipo una presión de 30 a 40 libras/pulgada con gota chica tratando de cubrir hasta los límites de la pastura. Es conveniente comenzar las aplicaciones 2 ó 3 días antes de ingresar los animales. El producto no sufre alteraciones por acción de la luz solar. La lluvia lava el activo del producto por lo que en caso de lluvias debe aplicarse nuevamente. Si se observan síntomas de empaste, aumentar la dosis y controlar los equipos de aplicación. Para asegurar un buen resultado es conveniente suministrar la mitad de la dosis en la bebida y la mitad de la dosis con raciones, sales minerales o por aspersión en pasturas. Para asegurarse una efectiva medicación en el agua de bebederos,

utilizar 25 ml cada 100 L de agua en meses templados (otoño – primavera) y reducir a 16 mml cada 100 ml de agua en meses calurosos. Para una correcta dosificación se recomienda el uso de dosificador para bebederos tanques australianos. Se debe tener muy en cuenta en situaciones de alta incidencia, el correcto manejo de los potreros, cuidando el lote de animales. Si se presenta riesgo de muerte, se pueden tratar oralmente por medio de una sonda nasoesofágica con una dosis curativa equivalente a 4 a 5 veces la dosis recomendada. Se recomienda tratar a los animales 2 a 3 días antes de entrar a las pasturas empastadoras. El tratamiento debe ser continuo mientras haya riesgo de empaste.

Periodo de Retiro

-

Precauciones

Por ser irritante moderado de ojos y mucosa se recomienda, en caso de contacto con éstos el lavado con abundante agua y jabón. En caso de ingestión accidental, suministrar agua o leche. No inducir el vómito. Efectuar tratamiento sintomático. En caso de gelificación por frío, se reconstituye calentando a 4 0°C

Almacenamiento

Conservar entre 5 y 25 °C. No congelar.

Presentación

Baldes por 20 L.